

Để lại cá chưa đạt thương phẩm nuôi tiếp 1 tháng nữa.

Cách nuôi trên đây áp dụng ở các trang trại hay các hộ có am hiểu về kỹ thuật, có khả năng đầu tư cao vì dùng thức ăn công nghiệp viên như loại C522 của hãng Proconco để hạn chế sự thất thoát thức ăn, tránh ô nhiễm môi trường.

Nguồn: Kinh tế nông thôn, Số 19, 10/5/2004, tr. 8

***** NUÔI VỊT SIÊU THỊT

- Chuẩn bị chuồng trại và dụng cụ nuôi (cho 100 con): Diện tích chuồng nuôi khoảng $20m^2$, chuồng phải cao ráo, thoáng mát, trong những ngày nhiệt độ lên cao thì nên bố trí cho chuồng 2 chiếc quạt thông gió. Các dụng cụ nuôi gồm có: nhiệt kế (1 chiếc), mèt tre cho ăn (2 chiếc) với đường kính $0,8 - 1m$, máng uống tròn loại 2 lít (2 chiếc), máng ăn loại dài 70cm, rộng 50cm, cao 20cm (2 chiếc), máng uống loại 8 lít (1 chiếc). Ngoài ra, trong chuồng nuôi nên bố trí thêm sân chơi, bể tắm cho vịt.

- Chăm sóc, nuôi dưỡng: Có thể chăn nuôi vịt theo 2 phương pháp chính:

Chăn thả là chính: Trước khi thả vịt vào chuồng 3 ngày cần trộn vào đất chuồng bằng mùn cưa và sỏi ẩm ở nhiệt độ $31 - 32^{\circ}C$. Vịt 1 ngày tuổi chỉ cho uống nước sạch có pha B com-léch + đường glucô 5% + kháng sinh đa giá để phòng bệnh tiêu chảy. Đến 2 - 3 ngày tuổi cho vịt ăn bún hoặc cơm nhúng nước. Mật độ nuôi tuần đầu $40 - 60$ con/ m^2 , sang tuần thứ 2 giảm xuống còn $30 - 40$ con/ m^2 . Tập cho vịt làm quen với nước khi trời ấm $>30^{\circ}C$, cho vịt tắm 5 - 30 phút và tập ăn rau xanh. Từ ngày 16 -

25 tập cho vịt ăn thêm gạo và từ ngày 26 trở đi bắt đầu thả vịt ra ngoài đồng.

- Nuôi nhốt là chính: Cách chăm sóc cũng tương tự như trên, nhưng chỉ thả vịt ở trong vườn và tắm ở bể (mỗi ngày thay nước 1 - 2 lần), cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn thặng đã được chế biến sẵn.

- Phòng bệnh cho vịt: Tiêm phòng vaccin dịch tả cho vịt ở ngày tuổi 14 - 15, tiêm phòng vaccin tụ huyết trùng 2 lần cách nhau 15 - 20 ngày khi vịt đã được 25 ngày tuổi. Trừ các bệnh khác như É.Coli, tiêu chảy, thương hàn, hô hấp bằng các loại thuốc đặc hiệu: BiO, Nafa... Khi đàn vịt bị nhiễm bệnh cần tách riêng những con bị bệnh nặng riêng, điều trị 3 - 5 ngày cho khỏi rồi mới thả chung vào đàn. Những con còn lại cho uống liều phòng (bằng 1/2 liều trị), thời gian 1 - 2 ngày/lần.

Sau mỗi lứa nuôi cần tiến hành khử trùng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc như BiO-Step-T, BKA, Virkon, formon... Trước khi nuôi đàn kế tiếp để trống chuồng 10 - 15 ngày.

Nguồn: Nông thôn ngày nay, Số 140, 14/7/2004

CÁCH KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC

Với tôm ở giai đoạn còng nhỏ ($3 - 8cm$)

Dùng phương pháp kích thích vật lý bằng cách sử dụng yếu tố nhiệt độ và nồng độ muối của nước để giúp con tôm lột xác bằng cách: tháo nước trong ao ra chỉ giữ mức nước sâu $15 - 25cm$ rồi phơi

đáy 6-14 giờ tùy cường độ nắng mạnh hay yếu. Nhiệt độ trong ao sẽ tăng lên sau đó cho nước mới vào. Tôm bị sốc nhẹ mà lột xác ngay.

Với tôm lớn (9 - 20cm).

Với loại tôm này phải sử dụng phương pháp kích thích hóa học:

- Dùng formol nồng độ 10 - 20ml/m³ nước, chọn lúc sáng sớm, tạt đều trên mặt ao đã tháo cạn nước chỉ còn mức 20 - 30cm. Để như vậy khoảng 12 giờ, đến lúc chiều mát sẽ cho nước mới vào. Tôm bị kích thích nhẹ mà lột xác.

- Với những ao nuôi tôm đang có độ mặn cao (trên 34‰) phải sử dụng Saponin (chế phẩm từ thực vật) để kích thích mới có tác dụng: dùng 1,0 - 1,5kg Saponin cho 1.000m² ao. Trước khi sử dụng đem ngâm chất này 12 giờ trong nước cho nở ra rồi chọn lúc trời bắt đầu nắng (9 giờ sáng) rải đều trên mặt ao đã tháo cạn nước chỉ còn sâu 25 - 30cm, chờ đến 12 giờ trưa cho nước mới vào, tôm sẽ lột vỏ.

- Vôi cũng là chất được dùng để kích thích tôm lột xác theo nguyên lý làm thay đổi nhiệt độ và độ pH của nước đột ngột: hòa vôi vào nước rồi tạt đều trên mặt ao theo liều lượng 10 - 15 kg/1.000m² ao đã tháo cạn nước, chỉ còn sâu 15 - 25cm. Vôi sẽ có tác dụng làm tăng nhiệt độ và độ pH của nước lên. Để 4 - 6 giờ sau đó cho nước mới vào, tôm sẽ bị sốc nhẹ và lột xác.

Thời điểm để kích thích tôm

- Với tôm cỡ 3 - 8cm sẽ tiến hành kích thích lột xác mỗi tháng 2 lần vào các ngày 8 - 12 và 24 - 28 âm lịch.

- Loại tôm 9 - 12cm, kích thích vào các ngày 10-14 và 27-1 của tháng sau.

- Loại tôm 13 - 16cm, kích thích vào các ngày 12 - 16 và 28 - 3 của tháng sau.

- Loại tôm 17 - 20cm, kích thích vào các ngày 14 - 18 và 30 - 5 của tháng sau (hoặc từ 1 - 5 nếu tháng thiếu).

Nguồn: Nông thôn ngày nay, 4/10/2004

TRỒNG NẤM RƠM

Nấm rơm là loại nấm ăn quý, phát triển chủ yếu ở vùng nhiệt đới, đã được trồng ở châu Á từ lâu. Nhiều nước ở các lục địa khác cũng phát triển trồng nấm rơm trong nhà kính hay nhà lợp bằng tấm Polyétylen hoặc trồng theo hướng công nghiệp

Sau đây là phương pháp trồng nấm:

1. Chuẩn bị địa điểm:

Nấm rơm có thể trồng trên tất cả các nền đất khác nhau, ở ngoài trời hoặc trong mát, nhưng phải tránh nơi đọng nước, tránh xa chuồng gia súc.

- Nơi trồng phải bằng phẳng, cao ráo, tránh gió lùa hoặc phải làm hàng rào tránh gió, bố trí thẳng góc với hướng gió.

- Nếu đất trũng vào mùa mưa nên xé rãnh cho liep rộng 60 - 80cm, cao 10cm, dốc ở 2 mé để thoát nước khi tưới, không ngập úng khi mưa.

2. Chuẩn bị rơm rạ

Rơm tươi, rơm khô hoặc ra, trường hợp thiếu rơm rạ cũng có thể dùng lá khô, bã mía cũng được.