

người ở nông thôn trong vòng 10 năm trở lại đây đã tăng gấp đôi.

Với 90% người nghèo Việt Nam sống ở nông thôn, nông nghiệp phát triển tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong những năm qua, 80% thu nhập tăng thêm của các hộ thoát nghèo là nhờ vào sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hộ đói nghèo nông thôn giảm đều với mức 2% mỗi năm.

Trên 94% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã có trạm y tế; gần 100% xã có trường tiểu học, gần 90% số xã có điện lưới quốc gia và 58% dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù nền nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, nhưng chưa thể nói quá trình phát triển của nông nghiệp Việt Nam là bền vững. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra với tốc độ nhanh, thay đổi cơ cấu mạnh đã làm thay đổi cả phương thức sử dụng tài nguyên tự nhiên đất, nước, sinh học trên quy mô lớn, bên cạnh đó công tác điều tra khảo sát quy hoạch, thiết kế, kiểm tra, giám sát còn nhiều bất cập làm xuất hiện nguy cơ phá vỡ cân bằng sinh thái, đe dọa khả năng cạnh tranh vững bền của ngành hàng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam ngày 22/2/2005

II - CÁCH LÀM ẲN MỚI

GIEO TRỒNG DƯA CHUỘT XUÂN YÊN

Giống dưa chuột Xuân Yên có nguồn gốc từ Trung Quốc, sinh trưởng khỏe, phát triển nhanh, lá nhỏ hơi đậm, kháng được virus, sương mai, phấn trắng. Thời gian thu hoạch sớm, sản lượng cao, thích hợp cho gia công làm dưa muối xuất khẩu.

Thời vụ gieo trồng

Vụ xuân là vụ chính gieo hạt từ sau tiết lập xuân đến đầu tháng 3, thu hoạch tháng 4-5. Vụ đông gieo từ tháng 8-9 đến đầu tháng 10, thu hoạch từ trung tuần tháng 10 đến giữa tháng 12.

Cách gieo hạt, ươm cây

Gieo bằng bầu đất, với phân chuồng hoại mục, đất xốp nhẹ, mùn trâu trộn đều theo tỉ lệ 30:60:10.

Hạt giống đem ngâm nước 4 giờ, rồi ủ 24 giờ thì hạt nảy mầm, đem gieo mỗi bầu đất 1 hạt. Nếu gặp thời tiết lạnh phải giấm tưới nước, vườn ươm phải che lưới hoặc nilon để chống lạnh, để cây phát triển. Thời gian ươm cây vào khoảng 8 ngày, khi cây được 2-3 lá thật đem trồng. Lượng hạt giống 0,8-1kg/ha.

Khoảng cách giữa các cây 40cm, hàng cách hàng 60cm. Mật độ trồng 33.000 cây/ha.

Làm luống

Dưa chuột rễ ngắn, đất không cần cày sâu, nhưng phải làm luống cao để

tiện tưới tiêu nước và rễ phát triển. Lên luống rộng 1,4m, cao 0,3m.

Bón phân

Mỗi ha bón 20 tấn phân chuồng ủ mục với 250-300kg lân hữu cơ vi sinh, 150kg phân urê, 220kg kali sunphat, 200kg supe lân.

Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân, và 1/3 số urê và kali dùng bón lót; bón thúc 2/3 số urê và kali còn lại chia làm 4 thời kỳ: bón thúc đợt 1 khi cây đã bén rễ, bón xung quanh gốc cách cây khoảng 15cm, bón thúc lần 2 cách lần 1 là 10 ngày, thúc lần 3 khi cây bắt đầu có hoa và thúc lần 4 khi cây vào thời kỳ cho quả nhiều nhất.

Chăm sóc

Khi đưa chuột ra nhánh phải cắt tỉa. Để tiện chăm sóc sau khi làm cỏ, bón phân lần 2, vun đất xong mới cắt tỉa. Tỉa nhánh, ngắt ngọn, ngắt quả, khi nhánh có bông cái chứa 1 lá rồi ngắt ngọn, những quả cong, sâu bệnh phải ngắt bỏ.

Phòng trừ sâu bệnh

- Trừ sâu hại như: bọ trĩ dùng Confidorr 100SL, Admire 050EC, Oncol, Regent; dòi đục lá dùng Baythroid 50EC, Cyper Map EC; sâu ăn tạp sử dụng Bulldock 025SL, Sumicidin, Viphenisa; rầy mềm dùng Confidorr 100SL, Admire 050EC, Bulldock 025EC...

- Trừ bệnh hại như: bệnh cháy nhựa thân, phun tưới Benlate, Copper B23% vào gốc, ngừa trị bằng Antracol 175WP, Topsin, Aliette 80WP... và cần

giảm nước, phân; bệnh thối gốc, lở cổ rễ: bón vôi, luân canh với cây trồng nước, phun ngừa và phun định kỳ Topsin, Ridopez, Polygram, Validacin 3SC; bệnh thối rễ, héo dây phòng trừ bằng Polygram DT80, Ridozeb 72WP; bệnh sương mai trừ bằng Bayfidan 250EC, Antracol 70WP Ridomin 25WP...; bệnh phấn trắng dùng Benlate 0,01%, Topsin 0,1% Anvil, Carbenda 50SC...; bệnh thán thư phun Antracol 70WP phun 7-10 ngày/lần, Zineb hoặc Mancozeb...

Nguồn: Nông thôn ngày nay, Số 11, 17.01/2005

TRỒNG CẢI BỆ ĐÔNG DƯ AN TOÀN

Cải bệnh Đông Dư thuộc nhóm cải ngọt, bệnh lá to, dày và trắng, lá non cuộn lại thành cuộn ở giữa. Năng suất có thể đạt 1,5-2 tấn/sào Bắc bộ (360m²). Vụ thu đông gieo hạt từ tháng 8 đến tháng 11. Có thể gieo trực tiếp ngoài ruộng hoặc gieo ở vườn ươm rồi đem ra cấy.

Vườn ươm: Làm đất nhỏ, lên luống rộng 1m, cao 30cm, rãnh rộng 30cm. Bón lót phân chuồng hoai mục 2-3kg/m². Lượng hạt giống gieo liền chân 0,5-1g/m². Gieo xong phủ trấu hoặc rơm rạ lên mặt luống, dùng vôi phun odoa tưới mỗi ngày một lần.

Dùng Busudin bột 1kg/sào Bắc bộ (rắc đều vào luống trước khi gieo) hoặc Padan 0,1% (phun sau khi gieo hạt) để phòng trừ kiến, để cắn hạt giống. Phun Alvin, Carbezim cho cây con 1-2 lần để phòng bệnh lở cổ rễ.