

- Lần 2: trước khi thu hoạch 10 - 15 ngày
(lượng phân NPK 3 - 5 kg ngâm tưới).

Khoảng cách giữa lần bón thúc có thể
bổ sung thêm các chế phẩm phân hữu cơ.

5- Chăm sóc:

- Làm dàn che bằng lưới (mùa nắng
giảm nhiệt độ, mùa mưa hạn chế dập ngò).
Thường xuyên chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước
đủ ẩm, bón phân hoặc dùng chế phẩm EM
kịp thời cho cây.

II. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

Đối với cây ngò sâu hại chủ yếu: rầy,
rệp dùng thuốc Actara, Confidor.

Bệnh chủ yếu là bệnh thối nhũn, vàng lá,
đốm lá dùng thuốc Validacin, Score, Tilt super.

*** Chú ý:**

Khi dùng thuốc BTVTV đảm bảo nguyên
tắc “4 đúng”: đúng thuốc - đúng liều lượng -
đúng lúc - đúng cách, sử dụng đúng theo
hướng dẫn trên bao bì và thời gian cách ly.

IV- THU HOẠCH:

Tiến hành thu hoạch khi rau đủ tuổi, nhổ
bó và rửa sạch đất ở gốc, dựng ngò vào giỏ
tránh làm dập ngò.

HƯỚNG DẪN

KỸ THUẬT TRỒNG RAU NGÒ AN TOÀN



TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH ĐỊNH

Rau ngò có mùi thơm, là loại rau dùng để làm gia vị trong bữa ăn hàng ngày.

I- GIỐNG:

Hiện nay các giống nhập nội, giống Thái Lan, giống Nhật Bản hoặc giống địa phương.

Đối với ngò, tiến hành gieo trực tiếp trên luống mà không qua giai đoạn cây con để trồng.

Cần phải cà bể hạt trước khi gieo. Thời gian từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch 30 - 40 ngày.

Lượng hạt giống gieo từ 5,0 - 6,0 kg/sào.

II- KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC:

1- Thời vụ:

- Trong điều kiện hiện nay cây ngò trồng được quanh năm.

2- Làm đất:

- Cày bừa kỹ và làm sạch cỏ dại.
- Rau ngò thích hợp trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, bằng phẳng (làm đất gieo ngò cần phải băm nhỏ kỹ hơn), đất dễ thoát nước, đất được cày, phơi ải từ 5-7 ngày trước khi lên luống mới.

- Luống rộng 1-1,2 m, chiều cao luống từ 15-25 cm (tùy theo mùa), rãnh luống rộng 30 cm, chiều dài luống tùy theo kích thước thửa ruộng. Bón phân lót, xới và trộn đều phân.

3- Mật độ, khoảng cách:

Đối với cây ngò gieo trực tiếp trên luống không qua luống ươm. Cần gieo mật độ hợp lý, không nên gieo dày quá sẽ bị bệnh thối nhũn. Sau khi gieo xong phủ qua một lớp đất mỏng và phủ một lớp rơm dày, sau 7 ngày lấy bớt rơm để lại một lớp rơm mỏng để giữ ẩm cho đất.

4- Bón phân:

+ Bón lót:

Phân chuồng hoai mục: 1.000 kg - 1.200 kg/sào hoặc phân giun: 500 - 700 kg/sào.

Phân Bi Fa: 20 - 25 kg/sào; phân lân: 20 - 25 kg/sào; vôi 25 - 30 kg/sào (bón 7-10 ngày trước khi trồng).

+ Bón thúc:

- Lần 1: sau khi mọc 8-10 ngày (lượng phân NPK 3-5 kg ngâm tưới).