

(lượng phân NPK 4 - 6 kg ngâm tưới).

6- Chăm sóc:

- Làm dàn che bằng lưới (mùa nắng giảm nhiệt độ, mùa mưa hạn chế dập xà lách). Thường xuyên chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước đủ ẩm, bón phân hoặc dùng chế phẩm EM kịp thời cho cây sinh trưởng, phát triển đồng đều.

III- PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

Sâu thường gây hại là sâu ăn lá, sâu nách, sâu xám có thể dùng thuốc: Success, BT, Delfin, Xentury, Pegasus.

Xà lách ít nhiễm các loại sâu, bệnh, mặt khác xà lách là loại rau ăn lá trực tiếp do đó không được sử dụng thuốc BVTV.

* **Chú ý:**

Khi dùng thuốc BVTV đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” : đúng thuốc - đúng liều lượng - đúng lúc - đúng cách, sử dụng đúng theo hướng dẫn trên bao bì và thời gian cách ly.

IV- THU HOẠCH:

Tiến hành thu hoạch khi rau đủ tuổi, chú ý không để xà lách quá già nhất là trong mùa Hè làm mất giá trị của rau. Nhổ, bỏ các lá già gần gốc, bó rửa sạch gốc xếp vào giỏ tránh làm dập lá.

**SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG**

HƯỚNG DẪN

KỸ THUẬT

TRỒNG XÀ LÁCH AN TOÀN



Năm 2004

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH ĐỊNH

Xà lách là loại rau ăn sống phổ biến, do đó chất lượng rau ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

I- GIỐNG:

Chọn giống có năng suất cao phù hợp với điều kiện địa phương, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, có thể sử dụng giống của Công ty Đại Địa, Công ty giống cây trồng miền Nam hoặc giống địa phương. Thời gian từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch 45 - 50 ngày.

Lượng hạt giống từ 90 - 100 gr/sào.

II- KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC:

1- Thời vụ:

Xà lách có thể trồng được quanh năm.

2- Làm đất:

- Cây bừa kỹ và làm sạch cỏ dại.
- Rau xà lách có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, bằng phẳng (làm đất gieo xà lách cần phải băm nhỏ kỹ), đất dễ thoát nước, đất được cày, phơi ải từ 5 - 7 ngày trước khi lên luống mới.
- Lên luống rộng 1 m, chiều cao luống từ 20 - 25 cm (tùy theo mùa), rãnh luống rộng 30 cm, chiều dài luống tùy theo kích thước thửa ruộng.

Bón phân lót, xới và trộn đều phân.

3- Mật độ, khoảng cách:

Hàng x hàng: 15 cm.

Cây x cây : 15 cm.

4- Xử lý hạt giống và cách trồng:

- Xử lý hạt giống trước khi trồng bằng Ridomil hoặc Carbenda, Rovral.
- Gieo qua luống ươm rồi mới nhổ cây con đem trồng từ 20 - 23 ngày. Hoặc gieo thưa trực tiếp trên luống không qua luống ươm. Sau khi gieo xong phủ qua một lớp rơm mỏng giữ ẩm cho đất.

5- Bón phân:

+ Bón lót:

Phân chuồng hoai mục: 700 kg - 800 kg/sào hoặc phân giun: 700 - 800 kg/sào.

Phân Bi Fa: 20 - 25 kg/sào; phân lân: 20 - 25 kg/sào; vôi 20 - 25 kg/sào (bón 7 - 10 ngày trước khi trồng).

+ Bón thúc:

- Lần 1: sau khi trồng 4 - 6 ngày (lượng phân NPK 3 - 4 kg ngâm tưới).
- Lần 2: sau lần 1 từ 12 - 15 ngày (lượng phân NPK 4 - 6 kg ngâm tưới).
- Lần 3: trước khi thu hoạch 5 - 7 ngày