

đều. Tăng hiệu quả sử dụng đất có thể trồng xen cải xanh, cải ngọt quanh mép luống.

- Có thể phun thêm các chế phẩm phân hữu cơ hoặc chế phẩm EM giữa các lần bón thúc.

III- PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

+ Các đối tượng sâu thường gây hại chính là: dòi đục lá, bọ trĩ, sâu xanh da láng ... Các loại thuốc trừ sâu hại như: Delfin WG, Dipel, Confidor, Success 25 SC, Aztrol, Thuricide,...

+ Các loại bệnh thường gây hại: bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân, bệnh đốm nâu lá hành có thể dùng các loại thuốc như: Score, Tilt super.

+ Bệnh thối bẹ, thối củ dùng thuốc Validacin, Rovral, Ridomil GOLD hay Carbendazym.

** Chú ý:*

Khi dùng thuốc BVTV đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” : đúng thuốc - đúng liều lượng - đúng lúc - đúng cách, sử dụng đúng theo hướng dẫn trên bao bì và thời gian cách ly.

IV - THU HOẠCH

Tùy theo giá cả thị trường tiêu thụ có thể thu hoạch ở độ tuổi vừa bán hoặc thu hoạch đúng độ chín để bán giống .

SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

HƯỚNG DẪN

KỸ THUẬT **TRỒNG HÀNH AN TOÀN**



Năm 2004

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH ĐỊNH

Hành thuộc loại thân thảo, có mùi đặc biệt, có củ và lá dùng để làm gia vị.

I- GIỐNG

Hiện nay chỉ dùng giống địa phương có 2 loại giống: loại gốc thân trắng và loại gốc thân đỏ, có thời gian từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch 45 - 50 ngày. Khi chọn giống phải tương đối đồng đều, đúng tuổi, không bị nhiễm sâu bệnh.

Lượng giống từ 100 - 120 kg/sào.

II- KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1- Thời vụ:

Hành có thể trồng được quanh năm, vụ Đông xuân thường thu hoạch năng suất cao và ít sâu bệnh hơn vụ Hè.

2- Làm đất:

- Cày bừa kỹ và làm sạch cỏ dại.
- Hành có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, bằng phẳng, đất dễ thoát nước, đất được cày, phơi ải từ 5 - 7 ngày trước khi lên luống mới.

- Lên luống rộng 1,0 m, chiều cao luống từ 20 - 30 cm (tùy theo mùa), rãnh luống rộng 30 cm, chiều dài luống tùy theo kích thước thửa ruộng, nhưng không nên quá dài gây khó khăn trong quá trình chăm sóc. Bón phân lót, xới và trộn đều phân và ủ rơm kín trên mặt luống trước khi trồng.

3- Mật độ và khoảng cách:

Hàng x hàng: 20 cm.

Cây x cây : 10 cm.

4- Xử lý giống và cách trồng:

- Xử lý giống trước khi gieo bằng thuốc Ridomil hoặc carbenda, Rovral.
- Cắt ngọn 1/4 trước khi trồng.

5- Bón phân:

+ **Bón lót:**

Phân chuồng hoai mục: 800 kg - 1.000 kg/sào hoặc phân giun: 800 - 1.000 kg/sào).

Phân Bi Fa: 20 - 30 kg/sào; phân lân: 20 - 25 kg/sào; phân kali: 8 - 12 kg/sào; vôi 25 - 30 kg/sào (bón 7 - 10 ngày trước khi trồng).

+ **Bón thúc:** (Hòa phân vào nước tưới bằng thùng ozoa).

- Lần 1: sau khi trồng 7-10 ngày, lượng phân NPK 2-5 kg/sào.

- Lần 2: sau khi gieo 15 - 17 ngày, lượng phân NPK: 2-5kg/sào.

- Lần 3: sau khi gieo 20-23 ngày, lượng phân NPK : 5-7 kg/sào.

- Lần 4: sau khi gieo 29-35 ngày, lượng phân NPK 2-4 kg/sào.

6- Chăm sóc:

- Thường xuyên chăm sóc, nhổ cỏ kịp thời, tưới nước đủ ẩm cho cây, bón phân kịp thời để cho cây sinh trưởng, phát triển đồng