

6- Chăm sóc:

- Làm dàn che bằng lưới (mùa nắng giảm nhiệt độ, mùa mưa hạn chế dập cây). Thường xuyên chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước đủ ẩm, bón phân hoặc dùng chế phẩm EM kịp thời cho cây sinh trưởng, phát triển đồng đều.

III- PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

- Các đối tượng sâu thường gây hại chính là: sâu ăn tạp, sâu xanh, bọ nhầy, sâu tơ, các loại thuốc dùng: Success, Aztron, Thuricide, Regent,...

- Các loại bệnh thường gây hại trên cải: bệnh thối nhũn, sử dụng thuốc: Ridomil, Validacin,...

* Chú ý:

Khi dùng thuốc BVTV đảm bảo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc - đúng liều lượng - đúng lúc - đúng cách, sử dụng đúng theo hướng dẫn trên bao bì và thời gian cách ly.

IV. THU HOẠCH:

Tiến hành thu hoạch khi rau đủ tuổi, thu hoạch nhanh, tập trung, không nên thu hoạch rải rác dễ bị sâu bệnh gây hại nặng. Khi nhổ cải bỏ những lá già gần gốc, bó và rửa sạch gốc, dựng vào giỏ tránh làm dập lá.

SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

HƯỚNG DẪN

KỸ THUẬT TRỒNG CẢI NGỌT, CẢI XANH AN TOÀN



Năm 2004

Cây cải là loại rau ăn lá, thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao, dễ trồng.

I- GIỐNG:

Chọn giống có năng suất cao phù hợp với điều kiện địa phương, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, có thể sử dụng giống của Công ty Đại Địa, Công ty giống cây trồng miền Nam. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch 30-50 ngày lượng hạt giống từ:

- Gieo qua luống ươm 10-15 gr/sào.
- Gieo trực tiếp trên luống 30 gr/sào.

II- KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1- Thời vụ:

Rau cải có thể trồng được quanh năm.

2- Làm đất:

- Cày bừa kỹ và làm sạch cỏ dại.
- Rau cải có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, bằng phẳng, đất dễ thoát nước, đất được cày, phơi ải từ 5-7 ngày trước khi lên luống mới.

- Lên luống rộng 1 m, chiều cao luống từ 20 - 25 cm (tùy theo mùa). Rãnh luống rộng 30 cm, chiều dài luống tùy theo kích thước thửa ruộng, nhưng không nên quá dài gây

khó khăn trong quá trình chăm sóc. Bón phân lót, xới và trộn đều phân.

3- Mật độ, khoảng cách:

Hàng x hàng: 20 cm.

Cây x cây : 15 cm.

4- Xử lý hạt giống, cách trồng:

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc Ridomil hoặc carbenda.
- Gieo qua luống ươm rồi mới nhổ cây con đem trồng từ 20 - 23 ngày. Hoặc gieo thưa trực tiếp trên luống không qua luống ươm. Sau khi gieo xong phủ qua một lớp rơm mỏng giữ ẩm cho đất.

5- Bón phân:

+ Bón lót:

Phân chuồng hoai mục: 700 kg - 800 kg/sào (phân giun: 400 - 600 kg/sào).

Phân Bi Fa: 20 - 25 kg/sào; phân lân: 20-25 kg/sào; vôi 20 - 25 kg/sào (bón 7-10 ngày trước khi trồng).

+ **Bón thúc:** (ngâm phân tưới bằng thùng ozoa).

- Lần 1: sau khi trồng 6 - 8 ngày, lượng phân DAP 2 - 5 kg/sào.

- Lần 2: sau lần 1 từ 6 - 8 ngày, lượng phân DAP: 2 - 5 kg/sào.

- Lần 3: sau lần 2 từ 7 - 9 ngày, lượng phân DAP: 3 - 6 kg/sào.