

- Heo nái để xong cho uống nước ấm pha muối hoặc đường.

- Theo dõi để kiểm soát tránh heo mẹ đè heo con.

- Nếu heo nái sốt, âm hộ sưng có mủ, không cho con bú, bỏ ăn cần báo thú y can thiệp kịp thời.

- Ngày để không cho nái ăn, chỉ cho uống nước, sau đó tăng dần lượng thức ăn lên đúng tiêu chuẩn, khẩu phần và ngày thứ tư sau đẻ.

- Cung cấp nước uống đầy đủ cho nái, bảo đảm chuồng khô sạch. Thực hiện tắm chải khô là chủ yếu.

4.3 Heo con

- Khi số con sơ sinh sống nhiều hơn vú mẹ, cho bú sữa đầu xong ghép sang nái khác, hoặc loại bỏ những con xấu.

- Heo con phải luôn giữ ấm và che chắn tránh gió lùa. Biện pháp giữ ấm tốt nhất là kết hợp lót rơm và dùng đèn điện để giữ ấm.

- Nền chuồng thường xuyên giữ sạch và khô ráo.

- Thường xuyên sát trùng rón trong 3 ngày đầu.

- Tiêm sắt vào ngày thứ 3 với liều 100mg dextran sắt/con.

- Cho heo con ăn sớm bằng thức ăn tập ăn vào lúc 7-10 ngày tuổi.

- Những heo đẻ nếu không chọn làm giống, nên thiến vào lúc 10-14 ngày tuổi, nhưng chú ý không thiến trước và sau khi cai sữa 1 tuần.

- Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở và có thể cai sữa từ 28-30 ngày. Giữ heo con ở lại chuồng đẻ 3-7 ngày (sau khi đã dờ heo mẹ) và chuyển sang chuồng nuôi sau cai sữa.

5. Tiêm phòng

*** 5.1 Heo con**

- 7-10 ngày tuổi : tiêm phòng Ecoli
- 17-21 ngày tuổi : tiêm dịch tả lần 1.
- 21 ngày tuổi : tiêm phòng phó thương hàn.
- 35 ngày tuổi : tiêm phòng dịch tả lần 2.
- 30-45 ngày tuổi : tiêm phòng LMLM.

*** 5.2 Heo nái sinh sản**


- 6 tuần trước khi sinh : tiêm phòng Ecoli.
- 4 tuần trước khi sinh : tiêm phòng LMLM.
- 2 tuần trước khi sinh : tái chủng Ecoli.
- 25 ngày sau khi sinh : tiêm phòng tụ huyết trùng.
- 35 ngày sau khi sinh : tiêm phòng dịch tả.

6. Tẩy nội ký sinh trùng

- Heo con : lúc 40 ngày tuổi.
- Heo nái : 25 ngày trước khi sinh.



Trại lợn giống Cấp I Nhơn Hòa
ĐC : Xã Nhơn Hòa, Huyện An Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT : 056 - 837158



1. Chọn giống

- Chọn giống Yorkshire, Landrace hoặc con lai F₁ giữa Landrace và Yorkshire.
 - Chọn từ nái mắn đẻ ở lứa 2 → lứa 6, có số heo con cai sữa trên 9 con/ổ.
 - Khối lượng lúc 3 tháng tuổi: trên 25 kg.
 - Heo có ngoại hình cân đối, thon dài chắc chắn, ngực rộng không sâu, vai, hông nở, 4 chân thẳng khỏe, đi bằng móng, đi lại tự nhiên.
 - Lông thưa, mượt, da mỏng và hồng hào.
- Dáng nhanh nhẹn, phàm ăn và hiền lành.
- Có từ 12 - 14 vú, núm vú rõ, thẳng hàng, khoảng cách đều, không có vú lép. Đến tháng tuổi bầu vú, núm vú to.

2. Phối giống

- Heo 7-8 tháng tuổi, đạt trọng lượng 90-100kg có thể cho phối giống. Nên phối giống lần động dục thứ 2.
- Heo nái động dục thường đứng nằm không yên, ít ăn, âm hộ sưng đỏ. Thời gian động dục kéo dài 3-5 ngày.
- Thời điểm phối giống thích hợp là lúc âm hộ chuyển sang màu nhạt tái, tiết dịch nhờn đặc, ấn tay lên hông, heo đứng yên (*trạng thái mê y*). Đối với nái tơ thường phối giống chiều ngày thứ 3 hay sáng thứ 4, nái rạ phối giống vào sáng thứ 3.

3. Thức ăn

- Tổ hợp khẩu phần: Để dễ tổ hợp khẩu phần trong chăn nuôi gia đình, có thể chia khẩu phần làm 2 loại. Thức ăn căn bản và thức ăn bổ túc.

+ Thức ăn căn bản (TÁCB):

- Bắp (tám, gạo): 50%
- Cám gạo loại 1: 48%
- Premix + Khoáng: 2%

+ Thức ăn bổ túc (TÁBT):

Bột cá: 50%

Đậu nành rang hoặc khô đậu nành: 50%

- Cách phối chế và mức ăn:

Hạng heo (ngày tuổi)	T. Lượng (kg)	Tỉ lệ khẩu phần		Lượng T.Ă. kg/con/ngày
		TÁCB %	TÁBT %	
90-120	20-40	75	25	Ăn tự do
120-210	40-80	80	20	1,7-2,1
Nái hậu bị	80-100	80	20	2-2,5
Nái sau cai sữa hoặc chờ phối		75	25	3-4 ^(*)
Nái chữa		75	25	
01-40 ngày				1,8-2,2 ^(**)
41-80 ngày				2,5
81-110 ngày				3,0
Nái nuôi con		70	30	5-7 ^(***)

^(*) Heo nái sau cai sữa tùy theo thể trọng (ổm, mập) mà thức ăn biến động từ 3-4kg/con/ngày.

^(**) Nái chữa hậu bị 1,8kg - Nái chữa cơ bản 2,2kg.

^(***) Tùy thể trạng của heo nái và số heo con, mức biến động từ 5-7kg (2,5kg/nái + 0,35kg/heo con).

4. Nuôi dưỡng

4.1 Heo nái chữa

- + Thường sau khi phối giống 21 ngày, nếu nái không lên giống, nái đã có chữa. Thời gian chữa

từ 113-116 ngày (*trung bình 114 ngày*).

- + Tháng đầu sau khi phối giống, hạn chế tối đa mọi tác động có thể gây sẩy thai (gây sợ hãi, đánh đập, di chuyển...).
- + Cho heo ăn ngày 3 lần theo đúng loại thức ăn và định mức đã hướng dẫn.
- + Trước khi đẻ 14 ngày, tiêm phòng Vaccin, Ecoli và tiêm ADE.
- + Trước khi đẻ 7 ngày chuyển về chuồng đẻ (chuồng đẻ đã được vệ sinh sát trùng sạch sẽ và không có gió lùa).
- + Trước khi heo đẻ 2-3 ngày cần giảm lượng thức ăn xuống.

4.2 Heo nái nuôi con

- + Heo sắp đẻ, âm hộ mở to và tiết dịch nhờn, hay đi lại, đái dắt và có hiện tượng chảy sữa.
- + Đỡ đẻ phải có ổ úm heo con và được mắc bóng đèn để sưởi ấm, có khăn sạch để lau, cồn I-ốt sát trùng và dụng cụ để cắt rốn, bấm răng.
- + Người đỡ đẻ phải thực hiện các thao tác:
 - * Lau sạch nhón ở mũi, miệng, toàn thân, cắt rốn và sát trùng bằng cồn I-ốt, bấm răng nanh sau đó cho vào ổ úm.
 - * Nếu nái đẻ bọc, phải xé bọc ngay.
 - * Sau khi đẻ heo con đứng vững cho bú sữa đầu ngay, sau 2 giờ lại cho bú tiếp. Thực hiện việc cố định đầu vú để đàn con đồng đều, chú ý con yếu cho bú vú trước và giữa.

Nái đẻ xong cần chú ý theo dõi lấy nhau, kiểm tra nhau (*qua núm nhau*) có ra hết không, không để heo mẹ ăn nhau.